



Pompa infuzyjna objętościowa



HY – Hialuronidaza; IG – Immunoglobulina
Fiołka(i) z lekiem



Strzykawka(i) 3-częściowa (typu Luer Lock)
o pojemności 30 ml



Zestaw igłowy do infuzji
podskórnej z samoprzylepnym
opatunkiem

Informacje ogólne dotyczące infuzji: pompa infuzyjna objętościowa Infuzja immunoglobuliny podskórnej wspomaganą hialuronidazą w 5 krokach

1.

Przygotowanie infuzji

- Sprawdź wszystkie fiołki
- Zgromadź odpowiednio wszystkie fiołki i materiały
- Umyj dokładnie ręce

2.

Przygotowanie HY

- Pobierz HY do strzykawek(i)
- Połącz strzykawkę z zestawem igłowym
- Wypełnij zestaw igłowy HY

3.

Przygotowanie IG

- Wypełnij dren do infuzji preparatem IG

4.

Wykonanie infuzji

- Wprowadź i zabezpiecz igłę
- Jako pierwszą wykonaj infuzję HY
- Następnie wykonaj infuzję IG przy pomocy pompy

5.

Zakończenie

- Usuń zestaw igłowy
- Odnotuj wykonanie infuzji




Gaziki nasączone alkoholem



Plaster i gaza**



Schemat podania w skrócie:

Przygotuj Pobierz HY do strzykawki (czynność pierwsza)




* Do pobrania zawartości z fiołki z rekombinowaną hialuronidazą ludzką o pojemności 1,25 ml należy użyć igły w rozmiarze 18–22 G, aby zapobiec wpełznięciu lub uszkodzeniu korka; w przypadku wszystkich innych wielkości fiołek do pobrania zawartości fiołki można użyć igły lub urządzenia bezigłowego.

Podaj Podaj HY przy pomocy strzykawki (czynność pierwsza)
Podaj IG przy pomocy pompy (czynność druga)



Dren do infuzji z filtrem 15 µm z komorą kroplową kompatybilny z pompą infuzyjną objętościową



Igła do pobierania hialuronidazy



Pojemnik na odpady medyczne**

HY – Hialuronidaza; IG – Immunoglobulina

Copyright © 2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki handlowe są własnościami ich prawowitych właścicieli.

Shire Polska Sp. z o.o.
Shire teraz część grupy Takeda
Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
☎ +48 22 223 03 00 ☎ +48 22 223 03 40

**Wymienione przedmioty nie są częścią zestawu z akcesoriami wydawanego bezpłatnie przez szpital. Należy je kupić oddzielnie.

Materiał Takeda do użytku własnego – nie do dystrybucji



**MATA DO WYKONYWANIA
INFUZJI IMMUNOGLOBULINY
PODSKÓRNEJ WSPOMAGANEJ
HIALURONIDAZĄ W 5 KROKACH
POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA**

Materiał ten jest przeznaczony wyłącznie do stosowania jako uzupełnienie szkolenia przeprowadzonego przez personel medyczny.

Pacjent może wykonywać infuzję immunoglobuliny podskórnej w domu wyłącznie po przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę i tylko wówczas, jeśli uważa, iż może swobodnie wykonać wszystkie niezbędne czynności. W przypadku jakichkolwiek pytań o infuzję immunoglobuliny podskórnej proszę skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub pielęgniarką.

Materiał dla pacjentów, przygotowany z inicjatywy i sponsorowany przez Takeda.

