




Pompa infuzyjna




HY – Hialuronidaza; IG – Immunoglobulina
Fiołka(i) z lekiem



Strzykawka(i) do pompy infuzyyjnej z łącznikiem zabezpieczającym Luer Lock o pojemności 50 ml lub 100 ml



Strzykawka 3-częściowa (typu Luer Lock) o pojemności 30 ml



Zestaw igłowy do infuzji podskórnej z samoprzylepnym opatrunkiem

Informacje ogólne dotyczące infuzji: pompa infuzyjna Infuzja immunoglobuliny podskórnej wspomaganą hialuronidazą w 5 krokach

1.

Przygotowanie infuzji

- Sprawdź wszystkie fiołki
- Zgromadź odpowiednio wszystkie fiołki i materiały
- Umyj dokładnie ręce

2.

Przygotowanie HY

- Pobierz HY do strzykawk(ek)
- Połącz strzykawkę z zestawem igłowym
- Wypełnij zestaw igłowy HY

3.

Przygotowanie IG

- Pobierz IG do strzykawk(ek)

4.

Wykonanie infuzji

- Wprowadź i zabezpiecz igłę
- Jako pierwszą wykonaj infuzję HY
- Następnie wykonaj infuzję IG przy pomocy pompy


5.

Zakończenie


- Usuń zestaw igłowy
- Odnótuż wykonanie infuzji

Schemat podania w skrócie:

Przygotuj Pobierz HY do strzykawk(ek) (czynność pierwsza)
Pobierz IG do strzykawk(ek) (czynność druga)



Podaj Podaj HY przy pomocy strzykawki (czynność pierwsza)
Podaj IG przy pomocy pompy (czynność druga)



* Do pobrania zawartości z fiołki z rekombinowaną hialuronidazą ludzką o pojemności 1,25 ml należy użyć igły w rozmiarze 18-22 G, aby zapobiec wpełnięciu lub uszkodzeniu korka; w przypadku wszystkich innych wielkości fiołek do pobrania zawartości fiołki można użyć igły lub urządzenia bezigłowego.

HY – Hialuronidaza; IG – Immunoglobulina




Gaziki nasączone alkoholem



Plaster i gaza**



Pojemnik na odpady medyczne**



Przyrząd do bezigłowego pobierania immunoglobuliny z fiołki



Igła do pobierania hialuronidazy

**Wymienione przedmioty nie są częścią zestawu z akcesoriami wydawanego bezpłatnie przez szpital. Należy je kupić oddzielnie.

**MATA DO WYKONYWANIA
INFUZJI IMMUNOGLOBULINY
PODSKÓRNEJ WSPOMAGANEJ
HIALURONIDAZĄ W 5 KROKACH
POMPA INFUZYJNA**

Materiał ten jest przeznaczony wyłącznie do stosowania jako uzupełnienie szkolenia przeprowadzonego przez personel medyczny.

Pacjent może wykonywać infuzję immunoglobuliny podskórnej w domu wyłącznie po przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę i tylko wówczas, jeśli uważa, iż może swobodnie wykonać wszystkie niezbędne czynności. W przypadku jakichkolwiek pytań o infuzję immunoglobuliny podskórnej proszę skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub pielęgniarką.

Materiał dla pacjentów, przygotowany z inicjatywy i sponsorowany przez Takeda.

